BREAST & BOWEL SCREENING









Tel: 800 1112 info@screenforlife.qa www.screenforlife.qa

facebook.com/ScreenForLifeQA



instagram/Screenforlifeqa



Bowel Cancer ScreeningImportance for Women and Men

The Breast and Bowel Screening Program is a life-saving, population-based initiative that aims to promote education, awareness and early detection of breast and bowel cancer in Qatar. Titled 'Screen for Life', it is being conducted under Qatar's National Cancer Program, which represents a shift towards preventive and community-based care. The Primary Health Care Corporation (PHCC), a provider of a wide range of primary healthcare services across the State of Qatar, has been given the authority to lead the program. The program encourages men and women **aged 50-74** years with no symptoms to receive bowel cancer screening through the FIT kit, which is generally considered safe, quick and painless. The Ministry of Public Health recommends bowel cancer screening once every 2 years.

Dedicated breast and bowel screening centers have been opened in Qatar at the following Health Centers:



When Should You Get

SCREENED?

If you are a man or woman **aged 50-74** with no symptoms, then you have to get screened. 1

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF BOWEL CANCER?

Do you know?

90%
is the Survival rate from bowel cancer, when caught at an early stage. 2

Bowel screening is for men and women **aged 50-74** with no discernible symptoms.

- $\mathbf{\hat{k}}$ Blood in your stool or rectal bleeding.
- A change, such as diarrhea or constipation, in your bowel habits lasting two weeks or more.
- Rersistent cramps, gas, or pain.
- Reeling that your bowel won't empty completely.
- 🎗 Unexplained iron deficiency anemia.
- Repressive, unintentional weight loss.

If you have one or more of the above symptoms, consult your PHCC physician

1 - Qatar's Ministry of Public Health National Guidelines / 2 - American Cancer Society





WHAT ARE THE RISK FACTORS?

- A Family history of bowel cancer or polyps.
- X You have chronic inflammatory diseases of the bowel, such as Ulcerative Colitis or Crohn's Disease.
- X You have inherited abnormal genetic syndromes that indicate risk, particularly familial adenomatous polyposis and hereditary non-polyposis colorectal cancer.
- X You have had bowel cancer or adenomatous polyps in the past.
- X You are overweight.
- X You have a low-fiber, high-fat diet.
- X You drink alcohol.
- X You have diabetes.
- X You have a sedentary lifestyle.
- X You smoke.

You should get screened if you are between 50 and 74 years old and asymptomatic (whether you have any of the above risk factors or not). Contact PHCC Call Center at 8001112 to book your appointment



You cannot change risk factors such as family history, but you can take preventive measures to reduce your risk of bowel cancer in other ways.

- Don't smoke.
- Control your weight.
- Get at least 150 minutes per week of aerobic activity.
- Limit consumption of red meat.
- Eat a variety of fruits, vegetables and whole grains.
- Avoid exposure to radiation and environmental pollution.
- Avoid alcohol.

IMPORTANCE OF SCREENING...

When caught early, the survival rate for bowel cancer is about 90%. A polyp takes up to 10 years to develop into bowel cancer. With regular screening, suspicious polyps can be removed before they ever have a chance to become cancerous. Screening can help find bowel cancer early, when it is highly curable.

Bowel screening is one of the most important decisions you can make for yourself and your family.





WHAT WILL HAPPEN DURING MY SCREENING?

No special diet. No exam risks. Bowel cancer screening couldn't be easier. Screening is performed through a non-invasive test called FIT (Fecal Immunochemical Test). FIT detects blood in your stool, which requires further investigation.

You can pick up the safe, easy-to-use FIT kit and collect the necessary samples in the comfort and privacy of your own home. The FIT kit comes with complete instructions on how to collect and return samples.

If you have an abnormal result, you may be asked to follow up with another appointment. Such a result does not automatically mean that you have cancer, and it is important to adhere to all clinical recommendations to determine the cause of your result.



What is FIT?

The fecal immunochemical test (FIT) is a new test that detects small amounts of blood hidden in the stool. This trace amount may sometimes indicate polyps or cancer; however, this is not necessarily the only reason. Sometimes, it can be due to any other abnormality.

What to Avoid?

- Do not collect the specimens if you have acute bleeding or hemorrhoids.
- For women, do not begin testing during your menstrual period or during the first three days after the end of your period.
- Do not collect the specimens that were completely in contact with toilet water.

FIT Kit

When you visit the screening clinic for your appointment, you will receive the FIT Kit which contains 3 bottles you will use to collect the samples.

Before collection be sure to keep sample bottles unopened at a storage temperature of 1-30°C. Do not open any bottle till you begin using it.

Do not use the sample collection bottle that has passed its expiration date. Expiration date is written on the bottle label.

Stool specimens must be collected from 3 bowel movements respectively from 3 different days.

Follow this procedure each time you collect a sample.







How to Collect the Samples?

Be sure that each sample bottle is correctly labeled with your information and the number of the sample (1, 2 or 3).



Wash your hands well before and after specimen collection.

Place toilet paper between the toilet seat and toilet bowl or

seat and toilet bowl or use a disposable clean and dry plastic container, then

have your bowel movement on top of the collection paper or into the plastic container.

Remove the green cap by twisting and pulling upwards.



5

Collect the fecal sample with the sampling probe by scraping from different areas of the surface of the feces.

Collect the amount enough to cover the groove of the probe only.



1. Diarrheal stool: scrape from as wide a range of the feces surface as possible.

2. Watery stool: scrape 2 times for 1 sampling bottle.





6


Insert the sampling probe straight to the sample collection bottle and close the cap. Do not repeat more than once. Shake the bottle vigorously up and down several times.



7

The sample collection tube can be stored in a specimen bag at room temperature for up to three days (an air-conditioned room) or in a refrigerator for up to seven days.

Once you collect the 3 samples, drop them off altogether as early as possible to the nearest PHCC laboratory.



DOES SCREENING REALLY

MAKE A DIFFERENCE?

When caught early, the survival rate for bowel cancer is about 90%. A polyp takes up to 10 years to develop into bowel cancer. With regular screening, suspicious polyps can be removed before they ever have a chance to become cancerous. Screening can help find bowel cancer early, when it is highly curable.

Bowel screening is one of the most important decisions you can make for yourself and your family.



هل من الممكن للكشف المبكر أن يصنع الفرق؟

هناك حقائق علمية لا يجب تجاهلها في هذا الصدد حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الكشف المبكر لسرطان الأمعاء يساهم في علاج ٩٠٪ من الحالات. حيث تحتاج الزوائد اللحمية إلى عشر سنوات لتتحول إلى سرطان الأمعاء.

مع الكشـف واكتشـاف هـذه الزوائـد مبكـرا يصبح مـن الممكـن إزالتهـا قبـل أن تصبح خلايـا سـرطانية.



كيف تقوم **بجمع العينات؟**

عليك التأكد من وجود ملصقك التعريفي على كل أنبوب بالإضافة لرقم العينة (ا أو ۲ أو ۳).



اغسل يديك جيداً قبل وبعد تجميع العينات.








قم بجمع العينة وذلك بتمرير عود التجميع على سطح البراز وفي عدة أماكن.

اجمع عينة تكفي لتغطية طرف العود كاملاً مع تجنب أن تكون هناك كمية زائدة عن المطلوب.




يد: **ـــــ ال** البراز.، من سطح البراز.،

إذا كان البراز سائل: قم بتمرير عود التجميع مرتين لنفس العينة.






أرجع العود مباشرة إلى الأنبوب، أغلق الغطاء جيداً ثم حركه بقوة، ولا تحاول فتح العلبة مجدداً لتكرار أخذ العينة.





يمكنك تخزين العينات لحين الانتهاء من تجميعها كاملة في غرفة مكيفة لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى، أو في الثلاجة لمدة سبعة أيام كحد أقصى. في حال الانتهاء من تجميع العينات الثلاثة قم بأخذها معاً في أقرب فرصة ممكنة وتسليمها لمختبر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية القريب لسكنك.





ما هو فحيص البراز المناعي الكيميائي (FIT)؟

فحص البراز المناعي الكيميائي هو اختبار حديث يقوم بالكشف عن الكميات القليلة من الدماء المخفية في البراز. إن وجود هذا القدر الضئيل من الدماء قد يدل أحياناً على وجود زوائد لحمية أو سرطان في الأمعاء. ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد، فقد يكون وجود هذه الكمية الضئيلة من الدماء بسبب أي اضطرابات أخرى.

ما الذي يجـب تجنبه؟

- لا تقم بجمع العينات إذا كان لديك نزيف حاد أو بواسير.
- لا تبدأى الاختبار خلال فترة الحيض أو خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد نهاية الدورة الشهرية.
 - لا تقم بجمع العينات التي لامست مياه المرحاض.

عبوة فحص الأمعاء

عندما تقوم بزيارة عيادة الكشف المبكر، ستستلم عبوة فحص الأمعاء التي تحتوي على ٣ أنابيب ليتم استخدامها لجمع العينات.

قبل البدء بجمع العينات احرص على حفظ الأنابيب في درجة حرارة تتراوح بين اــ٣٠ درجة مئوية، ولا تقم بفتح أي أنبوب إلا عند بدء استخدامك له.

لاً تقم بتجميع العينـة في حـال كان تاريـخ صلاحيـة أنبـوب التجميـع قـد انتهـى. إن تاريـخ الصلاحيـة مكتـوب على الملـصق الموجود على الأنبوب.

> يجب أن تقوم بجمع ثلاث عينات على مدار ثلاثة أيام مختلفة (عينة كل يوم).

اتبع التعليمات التالية في كل مرة تقوم فيها بجمع العينات.





ما هو فحص البراز المناعي الكيميائي (FIT)؟

هو اختبار جديد يقوم بالكشف عن الكميات القليلة من الدماء المخفية في البراز. وقد يؤشر وجود هذا القدر الضئيل من الدماء على وجود زوائد لحمية أو سرطان.

ماذا سيحدث خلال عملية الكشف؟

عملية الكشف المبكر بسيطة للغاية حيث لا يوجد نظام غذائي محدد يجب اتباعه أو إجراءات معقدة، أو حتى الانتظار في غرفة الطبيب. يتم الكشف من خلال تحليل يدعى: فحص البراز المناعي الكيميائي (FIT) وهو اختبار جديد يقوم بالكشف عن الكميات القليلة من الدماء المخفية في البراز، وقد يؤشر وجود هذا القدر الضئيل من الدماء على وجود زوائد لحمية او خلايا سرطانية.

سيعطيك الممرض أدوات تحليـل FIT، وستقوم بأخـذ العينـات بنفسـك فـي البيـت. تحتـوي أدوات الاختبـار علـى تعليمـات ترشــدك حـول كيفيـة أخـذ العينـات.

النتائج: عنـد ظهـور نتائج سـليمة فسـيتم ارسـال رسـالة نـصيـة لهاتفكـم المتنقـل، وعنـد ظهـور نتائج غيـر طبيعيـة سـيتم التواصـل معكـم لتحديـد موعـد للمتابعـة.

لا تعد النتائج غير الطبيعية دليلا قاطعا لوجود المرض، ولكن من المهم أن تلتـزم بجميـع التوصيـات العلاجيـة لتحديـد سـبب هـذه النتيجـة.





لا يمكنـك أن تغيـر بعـض العوامـل التـى تساعد فـى وجـود المـرض مثـل التاريخ الطبـى للعائلـة، ولكـن هنـاك بعـض العـادات التـى مـن الممكـن أن تسـاعـدك فى تجّنب سرطان الأمعاء، مثـل:

- ممارسة الرياضة ١٥٠ دقيقة على الأقل اسبوعياً.
 - الامتناع عن التدخين.
 - المحافظة على الوزن السليم.
 - التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء.
- تنويع النظام الغذائى ليحتوى على الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.
 - تقليل التعرض للإشعاعات والتلوث البيئي.
 - عدم شرب الكحول.

الكشف المبكر لماذا هو مهم؟

الكشـف المبكـر يصنـع الفـرق، لأنـه يسـاعد فـى المسـاهمة بمنـع الإصابـة بسـرطان الأمعـاء، فمـن الممكـن اكتشـاف الأورام الحميّــدة والزوائــد اللحميــة والنمــو غيــر الطبيعـــى للخلايـا داخــل الأمعـاء أو المســتقيم التــى تظهــر قبــل الإصابـة بالمــرض والتـى يمـّكـن إزالتهـا حينهـا. عندمـا يقـوم الرجـل والمـرأة غيـر المصابيـن بأعـراض سـرطَّان الأمعـاء بإجـراء الكشـف المبكـر، سيسـاهم ذلـك كثيـراً فـى زيـادة نسـبة الشفاء. وقد تصل نسبة الشفاء الـي ٩٠% إذا تـم اكتشافه فـي مرحلـة مبكـرة.

لا تتنظــر ظهــور الأعــراض، فمــن الممكــن للمــرض ان ينتشــر بــدون ظهــور أيـة اعـراض، بـادر بالكشـف المبكـر مـن اليـوم!



ماهي عوامل الخطورة؟

- 🤾 وجود تاريخ عائلي للاصابة بسرطان الأمعاء.
- وجود الأمراض الالتهابية المزمنة في الأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي وداء كرون.
 - رراثة جينات تساعد في تكوّن المرض أو تشير إلى التورم الغدي أو وجود تاريخ طبى عائلي للأمراض الحميدة.
 - 🤾 إصابة مسبقة بسرطان الأمعاء أو أي زوائد حميدة.
 - 🦹 زيادة الوزن بشكل مفرط.
- 🤾 إذا ما كان نظامك الغذائي يحتوى على الكثير من الدهون والقليل من الألياف.
 - 🤾 الإصابة بمرض السكرى.
 - 🤾 التدخين.
 - 🎗 إذا كنت قليل الحركة والنشاط البدني.
 - 🤾 شرب الكحول.

يجب القيام بالكشف اذا كان عمرك بين ،ه و ٧٤ ولا تعاني من أي أعراض (سواء كان لديك احدى هذه العوامل أو لا). اتصل بمركز الاتصال التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأوليّة على الرقم ٨٠١١١١٠ لحجز موعدك



متی یجب أن تقوم بالكشف المبكر؟

إذا كنت بين ٥٠–٧٤ سنة ولا تظهر عليك أية أعراض فعليك عمل الكشف المبكر. ا



ماهي أعراض سرطان الأمعاء؟

إن سرطان الأمعاء عند الرجال والسيدات ما بين ال ٥٠ و ٧٤ عامـاً عادة ما يصاحبه أعراض يمكن تمييزها.

- 🤾 فقر دم غير مبرر بسبب نقص الحديد.
- 🤾 وجود دم في البراز أو وجود نزيف في المستقيم.
- 🥻 مرونة، أو زيادة، أو نقصان في مرات التبرّز لمدة أسبوعين أو أكثر.
 - 🥻 تقلصات مستمرة، وجود للغّازات، مع الشعور بألم مستمر.
 - 🤾 الشعور بأن الأمعاء غير فارغة تماماً.
 - 🤾 فقدان الوزن بطريقة غير مبررة.

اذا شعرت بأحد الأعراض المذكورة أعلاه، فعليك مراجعة طبيبك فى المركز الصحى التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأوليّة

ا – التوصيات الوطنية لوزارة الصحة العامة في دولة قطر 🖊 ۲ – الجمعية الأمريكية للسرطان





الحُشف المبكر لسرطان الأمعاء وأهميته للرجال والسيدات.

برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء هو برنامج وطني يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للصحة يهدف لتحقيق نقلة نوعية في خدمات الرعاية المقدمة للمجتمئ لتقديم خدمات وقائية تتماشى مع مبادئ البرنامج الوطني للسرطان، بالإضافة الى رفئ الوعي داخل قطر بأهمية الفحص الروتيني والكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان وتأثيره على حماية الأرواح. تقوم مؤسسة الرعاية الصحية الاولية بتنفيذ برنامج «الكشف المبكر لحياة صحية». و ينصح البرنامج الرجال و السيدات بعمر عمر عملي ولا يعانون من أي أعراض، باجراء الكشف المبكر لسرطان الأمعاء باستخدام عبوة فحص البراز المناعي الكيميائي. وطبقاً لتوصيات وزارة الصحة العامة، يجب القيام بهذا الكشف مرة كل سنتين.

تم افتتاح المراكز التالية للكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء:

مركز الوكرة الصحي مركز لعبيب الصحي الصحي الصحي الصحي الصحي الصحي الصحي الوحدة المتنقلة للكشف المبكر







الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء





instagram/Screenforlifeqa

twitter.com/ScreenForLifeQA

Tel: 800 1112 info@screenforlife.qa www.screenforlife.qa

